


Descripción del Producto:

Nombre del Producto	Nombre Comercial	Descripción	Composición
Plasma Bovino Desechado (Consumo Animal)		<p>Es un producto de origen natural, obtenido a partir de la centrifugación de la sangre de bovinos de mataderos con inspección veterinaria ante- y post-mortem (IPSA), recolectada y procesada bajo estrictas condiciones sanitarias, de higiene, seguridad y trazabilidad.</p> <p>El plasma bovino es concentrado por evaporación y es sometido a un proceso de deshidratación spray-dryer, lo que garantiza alta solubilidad, conservación de las propiedades funcionales y nutricionales (proteínas de alto valor biológico) del producto.</p>	Plasma Bovino + Citrato de Sodio

Características

Sensorial

Parámetro	Especificación	Método
Aspecto físico	Polvo en particular finas	Visual
Color	Beige	Visual
Olor	Característico	Organoléptico
Sabor	Característico	Organoléptico

Físico-químicas

Parámetro	Especificación	Método
Proteína (Nx6.25)	75 ± 1%	Kjeldahl
Humedad	Máx. 7%	Estufa 105°C peso constante
Grasa	Max. 1%	Extracción Soxhlet
pH	7.5-9	pH-metro
Solubilidad	94 ± 2 %	Gravimétrico (w/w)
Sólidos Totales	94 ± 1 %	-
Sales	Máximo 18%	ASTM D512

Microbiológicas

Parámetros microbiológicos	Especificación	Método
Aerobios Mesófilos	≤ 100,000 UFC/g	AOAC 990.12
Salmonella (25g)	Ausencia	MLG 4.05 USDA-FSIS
Coliformes totales	≤100 UFC/g	(BAM), 8 th Edition, Chapter 4.
E. Coli genérico	≤100 UFC/g	(BAM), 8 th Edition, Chapter 4.
E. Coli O157-H7 (25 g)	Ausencia	AOAC 991.14

Aminoácidos (%p/p en base a la materia seca)

Parámetro	Especificación	Aminoácidos Digestibles	Método
Lisina, total	8.76%	-	ESS_3.4.7.219
Arginina	4.38%	3.98 %	ESS_3.4.7.219
Metionina	1.36%	1.1424 %	ESS_3.4.7.219
Treonina	4.96%	3.966%	ESS_3.4.7.219
Leucina	12.7%	11.05 %	ESS_3.4.7.219
Valina	8.40%	6.882 %	ESS_3.4.7.219
Histidina	6.10%	5.3173 %	ESS_3.4.7.219
Fenilalanina	6.94%	5.9614 %	ESS_3.4.7.219
Cistina	0.56%	0.4750 %	ESS_3.4.7.219
Triptófano	0.76%	0.6985 %	ESS_3.4.7.219
Isoleucina	0.38%	0.322 %	ESS_3.4.7.219
Tirosina	3.04%	2.3110 %	ESS_3.4.7.219
Glicina	3.52%	-	ESS_3.4.7.219
Serina	4.47%	-	ESS_3.4.7.219
Prolina	3.91%	-	ESS_3.4.7.219
Alanina	8.47%	-	ESS_3.4.7.219
Ácido aspártico	10.2%	-	ESS_3.4.7.219
Ácido glutámico	7.56%	-	ESS_3.4.7.219

* Análisis de Aminoácidos realizados en Laboratorios Exact Scientific Inc. (USA),
 1355 Pacific Place, Suite 101, Ferndale, WA 98248. Phone: (360) 733-1205, Fax:
 (888) 818-2978. Email: lab@exactscientific.com. Fecha: 17/1/2018

Aporte Nutricional

Parámetro	Especificación	Método
Energía Metabolizable en Cerdo Kcal/kg	3,300 Kcal/kg	Atwater
Energía Metabolizable en Ave Kcal/kg	3,114 Kcal/kg	Atwater
Digestibilidad en Pepsina	99.37 %	AOAC_971.09



Aplicaciones

<p>Aplicaciones</p>	<p>Ampliamente usado y aceptado en las dietas de las diferentes especies animales y en rumiantes donde la legislación local lo permita.</p> <p>En Cerdos: En formulaciones para alimentación de cerdos en pre - destete y destete, en la proporción de 3.0 al 5.0%, por su elevada digestibilidad y valor biológico de su proteína, también por la protección pasiva (efecto entérico) ligada al contenido de inmunoglobulina (IgG), la cual ejerce un efecto protector sobre la mucosa intestinal, previniendo o reduciendo la infección por E. Coli.</p> <p>En acuicultura: Peces y crustáceos una dosis típica se encuentra entre el 2-7%, mejora la consistencia, impermeabilidad/ flotabilidad y color del pellet.</p> <p>Aves: Formulación de alimentos para pollos parrilleros y ponedoras en porción entre 0.5-2.5%</p>
<p>Preparación para uso</p>	<p>Se recomienda utilizar como ingredientes en niveles de 0.5–5.0 % en formulaciones para alimentación en cerdos recién destetados, aves de corral, mascotas y otras especies animal.</p>
<p>Especies Recomendadas</p>	<p>Aves, porcinos, peces, mascotas (felinos y caninos), otras especies animales y en rumiantes donde la legislación local lo permita.</p>
<p>Presentación y empaque</p>	<p>Bolsas serigrafiadas de polipropileno grado alimentario, con recubrimiento interno de polietileno. Peso neto: 25 kg.</p>
<p>Sistema de distribución</p>	<p>Se transporta en camiones cerrados y/o contenedores secos, a temperatura ambiente.</p>
<p>Vida útil del producto</p>	<p>2 años a partir de su fecha de elaboración</p>
<p>Condiciones de manejo y conservación</p>	<p>Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco, seco y sin exposición al sol. Estibar en pallets a una altura mínima de 15 cm del piso, 50 cm de la pared. Para exportación se requiere que los pallets de madera sean fumigados y certificados por IPSA.</p>
<p>Registro sanitario IPSA</p>	<p>10576</p>
<p>Número de identificación GTIN</p>	<p>74-33200-73903-7</p>